

Obowiązuje w sezonie 2017

AGREST

Lista dopuszczonych środków ochrony roślin w uprawie agrestu

Nazwa handlowa środka ochrony	Substancja czynna	Zawartość	Ograniczenia rejestracyjne	Choroba/ szkodnik	Ilość/ha	Karencja /liczba dni/	Wysokość pozostałości mg/kg
owadobójcze							
Calypso 480 SC	tiachlopyrd	480g/l	opryskiwać 1 raz w sezonie	mszyce, <i>Drosophila suzukimszyce</i> , <i>Drosophila suzuki</i>	0,2	21	1
Mospilan 20 SP/Miros 20SP/Stonkat 20SP	acetamipryd	20%	opryskiwać do 2 razy w sezonie od fazy pierwszego liścia do końca kwitnienia	mszyce, zwójki, przeziernik porzeczkowy	0,2	14	2
Ortus 05 SC	fenpiroksymat	51,2 g/l	po kwitnieniu, po zbiorze	przędziorek chmielowiec	1,5	14	0,5
SpinTor 240SC	spinosad	240g/l	opryskiwać do 2 razy w sezonie od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców	mszyce, zwójki, <i>Drosophila suzukimszyce</i> , zwójki, <i>Drosophila suzuki</i>	0,32-0,4	3	
Afik	naturalne polisaharydy		po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,3%	0	
AgriTrap	wodny roztwór żywic i gum roślinnych		po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,3-0,6%	0	
Emulpar 940 SC	olej rydzowy i środki emulgujące		po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,9-1,2%	0	
Acetamp New 20 SP	acetamipryd	20,00	przed kwitnieniem, kwitnienie,	mszyce, przeziernik porzeczkowiec	0,2 kg	14	2,00

Siltac EC			po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,15-0,2%	0	
grzybobójcze							
Kapelan 80 WG/Kaplan 80 WG	kaptan	80%	od początku kwitnienia do dojrzewania owoców co 7-14 dni	szara pleśń, antraknoza	1,8	7	15,00
Nimrod 250EC	bupirimat	250 g/l	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, po zbiorze owoców	amerykański mączniak agrestu	0,75-1,5 l	14	5,00
Topas 100 EC	penkonazol	100g/l	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, po zbiorze owoców	amerykański mączniak agrestu	0,5	20	0,05
Zato 50 WG	trifloksystrobina	500 g/l	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, po zbiorze owoców	amerykański mączniak agrestu	0,2 kg	14	1,00
Topsin M 500 SC	tiofanat metylu	500 g/l	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	opadzina liści, amerykański mączniak agrestu, szara pleśń	1,5 l	14	0,1
Siarkol Extra 80 WP	siarka	80,00%	przed kwitnieniem, po kwitnieniu,	amerykański mączniak agrestu,	3-5 kg	7	
Yamato 303 SE	tiofanat metylu	303	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	amerykański mączniak agrestu,	1,2-1,5 l	10	0,1
Serenade ASO	bacillus subtilis		przed kwitnieniem, kwitnienie, po kwitnieniu	szara pleśń, antraknoza	8 l	-	

Dithane NeoTec 75 WG	mankozeb	75	przed kwitnieniem, kwitnienie,po kwitnieniu,po zbiorze	opadzina liści	2 kg	30	5
----------------------	----------	----	--	----------------	------	----	---

UWAGA: Środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą.