

## MALINA

## Lista dopuszczonych środków ochrony roślin w uprawie maliny

Nazwa handlowa środka ochrony	Substancja czynna	Zawartość	Ograniczenia rejestracyjne	Choroba/szkodnik	Ilość/ha	Karencja /liczba dni/	Wysokość pozostałości mg/kg
owadobójcze							
Acaramic 018 EC	abamektyna	18 g/l	przed kwitnieniem, owocowanie, po zbiorach, max 2x	przędziorek chmielowiec	0,5	3	0,1
Calypso 480 SC	tiachlopyrd	480g/l	przed kwitnieniem, po kwitnieniu po zbiorach, po wystąpieniu szkodników	mszyce, kwieciek, kistnik, przeziernik, <i>Drosophila suzuki</i> , przyszczarek	0,2	14	3
Envidor 240 SC	spirodiklofen	240 g/l	1x w sezonie przed kwitnieniem, po zbiorze	przędziorek chmielowiec	0,4	n.d.	0,02
Mospilan 20 SP/Stonkat 20SP	acetamipryd	20%	opryskiwać do 2 razy w sezonie od fazy pierwszego liścia do końca kwitnienia	mszyce, kwieciek, kistnik, przeziernik, przyszczarek	0,2	14	2
Ortus 05 SC	fenpiroksymat	51,2 g/l	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, maksymalnie 2x w sezonie	przędziorek chmielowiec	1,5	14	1,5
Patriot 100 EC	deltametryna	100g/l	od końca kwitnienia, po kwitnieniu, skuteczny do 20C	mszyce, przyszczarek, <i>Drosophila suzuki</i>	0,125	7	0,5
SpinTor 240SC	spinosad	240g/l	opryskiwać do 2 razy w sezonie od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców	zwójki, <i>Drosophila suzukizwójki</i> , <i>Drosophila suzuki</i>	0,32-0,4	3	1,5
Afik	naturalne polisaharydy		po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,3%	0	
AgriTrap	wodny roztwór żywic i gum roślinnych		po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,3-0,6%	0	

Emulpar 940 SC	olej rydzowy i środki emulgujące		po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,9-1,2%	0	
Forteca PRO 018 EC	abamektyna		przed kwitnieniem	przędziorek chmielowiec	0,5 l	3	0,08
Decis Mega 50 EW	deltametryna		przed kwitnieniem, kwitnienie, owocowanie	mszyce, przeziernik malinowiec, pryszczarek namalinek łądogowy	0,25 l	7	0,50
Acetamip New 20 SP	acetamipryd		przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	krzywki maliniaczek, pryszczarek, mszyce, kwiecień malinowiec, zwójki, przeziernik malinowiec, pryszczarek malinowiec	0,2 kg	14	2,00
Siltac EC	polimery silikonowe		po kwitnieniu, po zbiorze	preparat powierzchniowy wspomaga ochronę (mszyce, przędziorki)	0,15-0,2%	0	
grzybobójcze							
Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy		przed kwitnieniem, kwitnienie,	szara pleśń, zamieranie pędów malin	1,5 l	14	0,1
Yamato 303 SE	tiofanat metylu + tetrakonazol		przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	zamieranie pędów malin, szara pleśń	1,2-1,5 l	10	0,1
Serenade ASO	bacillus subtilis		kwitnienie, owocowanie	szara pleśń	8 l	-	
Kaplan 80 WG	kaptan	80%	przed kwitnieniem, kwitnienie, po kwitnieniu, po zbiorze owoców max 6x	szara pleśń, antraknoza	1,9	7	10,0
Mythos 300 SC	pirymetanił	300 g/l	kwitnienie, po kwitnieniu, po zbiorze owoców max 3x	szara pleśń, zamieranie pędów maliny	2,5	3	10,0
Polyversum WP	<i>Phytium oligandum</i>	10 <sup>6</sup> oospor grzyba w g	kwitnienie, po kwitnieniu, po zbiorze	szara pleśń, zamieranie pędów maliny	0,15-0,2kg	-	-

Rovral Aquaflo 500 SC	iprodion	500 g/l	przed kwitnieniem, kwitnienie, po kwitnieniu, po zbiorze owoców max 2x	szara pleśń, zamieranie pędów maliny	1,5-2,0 l	3	30,00
Sadoplon 75 WP	tiram	750 g/l	przed kwitnieniem, po zbiorze owoców max 4x	szara pleśń, zamieranie pędów maliny	3	28	0,1
Signum 33 WG	boskalid + piraklostrobina	26,7+67g/kg	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, maksymalnie 2x w sezonie	szara pleśń, zamieranie pędów maliny, rdza maliny	1,8 kg	3	3+3
Switch 62,5 WG	cyprodynil + fludioksonil	375 + 250 g/kg	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze owoców	zamieranie pędów, antraknoza, szara pleśń	0,8-1,0	7	3+5
Teldor 500SC	fenheksamid	500g/l	kwitnienie,owocowanie	szara pleśń, zamieranie pędów maliny	1,5	1	10,00
Zato 50 WG	trifloksystrobina	500 g/l	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze owoców (max 2x)	rdza maliny, zamieranie pędów	0,2	14	3

**UWAGA: Środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą.**